

Schema sintetico degli obblighi vaccinali previsti dalla Legge 119/2017 del 31 luglio 2017

		3° mese (61° giorno)	5° mese (121° giorno)	11° mese	13° mese	6 anni	13-14 anni
Vaccino esavalente	Anti-poliomielitica	● (1° dose)	● (2° dose)	● (3° dose)		● (4° dose)	● (5° dose per i nati a partire dal 2005)
	Anti-difterica	● (1° dose)	● (2° dose)	● (3° dose)		● (4° dose)	● (5° dose)
	Anti-tetanica	● (1° dose)	● (2° dose)	● (3° dose)		● (4° dose)	● (5° dose)
	Anti-epatite B	● (1° dose)	● (2° dose)	● (3° dose)			
	Anti-pertosse	● (1° dose)	● (2° dose)	● (3° dose)		● (4° dose)	● (5° dose)
	Anti- <i>Haemophilus</i> tipo b	● (1° dose)	● (2° dose)	● (3° dose)			
Vaccino MPRV oppure MPR+V	Anti-morbillo				● (1° dose)	● (2° dose)	
	Anti-rosolia				● (1° dose)	● (2° dose)	
	Anti-parotite				● (1° dose)	● (2° dose)	
	Anti-varicella				● (1° dose)		

Il seguente documento vuole essere di aiuto nella scelta del vaccino corretto da utilizzare sulla base della schedula vaccinale applicata nei singoli utenti. La tabella seguente dettaglia la tipologia di vaccini da somministrare (relativo nome commerciale) e le dosi previste nei soggetti nati dal 2001 al 2016 che risultano essere completamente non vaccinati.

Coorti	Esavalente	DTPa-Ipv	dT	Ipv	dTPa-Ipv	HBV	Hib	MPR
2001			sì (prime 2 dosi)	sì (prime 2 dosi)	sì, 3 ^a dose	3 dosi	1 dose	sì, 1 ^a e 2 ^a dose
2002			sì (prime 2 dosi)	sì (prime 2 dosi)	sì, 3 ^a dose	3 dosi	1 dose	sì, 1 ^a e 2 ^a dose
2003			sì (prime 2 dosi)	sì (prime 2 dosi)	sì, 3 ^a dose	3 dosi	1 dose	sì, 1 ^a e 2 ^a dose
2004			sì (prime 2 dosi)	sì (prime 2 dosi)	sì, 3 ^a dose	3 dosi	1 dose	sì, 1 ^a e 2 ^a dose
2005			sì (prime 2 dosi)	sì (prime 2 dosi)	sì, 3 ^a dose	3 dosi	1 dose	sì, 1 ^a e 2 ^a dose
2006			sì (prime 2 dosi)	sì (prime 2 dosi)	sì, 3 ^a dose	3 dosi	1 dose	sì, 1 ^a e 2 ^a dose
2007			sì (prime 2 dosi)	sì (prime 2 dosi)	sì, 3 ^a dose	3 dosi	1 dose	sì, 1 ^a e 2 ^a dose
2008			sì (prime 2 dosi)	sì (prime 2 dosi)	sì, 3 ^a dose	3 dosi	1 dose	sì, 1 ^a e 2 ^a dose
2009			sì (prime 2 dosi)	sì (prime 2 dosi)	sì, 3 ^a dose	3 dosi	1 dose	sì, 1 ^a e 2 ^a dose
2010		sì, se <7 (2 dosi); la 3 ^o dose con tetravac/tetraxim o poliInfanrix				3 dosi	1 dose	sì, 1 ^a e 2 ^a dose
2011		Sì (2 dosi); la 3 ^o dose con tetravac/tetraxim o poliInfanrix				3 dosi	1 dose	sì, 1 ^a e 2 ^a dose
2012		Sì (2 dosi); la 3 ^o dose con tetravac/Tetraxim o poliInfanrix				3 dosi	1 dose	sì, 1 ^a e 2 ^a dose
2013		Sì (2 dosi); la 3 ^o dose con tetravac/Tetraxim o poliInfanrix				3 dosi	1 dose	sì, 1 ^a dose
2014		sì, se >36 mesi (3 dosi)				3 dosi	1 dose	sì, 1 ^a dose
2014	sì, se <36 mesi*							sì, 1 ^a dose
2015	Sì (3 dosi)							sì, 1 ^a dose
2016	Sì (3 dosi)							sì, 1 ^a dose

* per i soggetti nati nel 2014 completamente non vaccinati che al momento della vaccinazione non hanno ancora compiuto i 3 anni, è possibile iniziare il ciclo primario con l'esavalente (valutare sempre scheda tecnica) e completarlo con gli altri prodotti disponibili.

La vaccinazione anti-varicella può essere fatta come quadrivalente MPRV oppure come vaccino monovalente; è obbligatoria a partire dai nati nel 2017.

Nella pratica quotidiana si possono presentare contesti variegati; alcuni soggetti avranno effettuato solo alcune delle vaccinazioni prestabilite o non avranno completato tutti i cicli vaccinali. Di seguito cerchiamo di riassumere le situazioni che con più frequenza possono manifestarsi.

MPR

Se effettuata solo 1 dose: completare il ciclo con la 2° dose in base all'età del soggetto

ESAVALENTE (difterite, tetano, pertosse, polio, Hib, HBV)

- Se il soggetto ha effettuato 1 sola dose:
 - **se è ≥7 anni:** continua il ciclo di base con 1 dose di dT, 1 dose di Ipv e conclude con dTPa-Ipv; vaccinare per Epatite B (3 dosi) e MPR.
 - **se >3 ma < 7 anni:** somministrare 1 dose di DTPa-Ipv (immunizzazione primaria) e concludere il ciclo con 1 dose di DTPa-Ipv (dose booster), effettuare 2 dosi HBV; vaccinare per MPR.
 - **se <3 anni:** completare il ciclo con 2 dosi di esavalente; vaccinare per MPR.
- se il soggetto ha effettuato solo 2 dosi:
 - **se è ≥7 anni:** concludere il ciclo con dTPa-Ipv; vaccinare MPR e concludere il ciclo per Epatite B (1 dose).
 - **se >3 ma < 7 anni:** concludere il ciclo con 1 dose di DTPa-Ipv (dose booster); vaccinare per MPR e concludere il ciclo per Epatite B (1 dose).
 - **se <3 anni:** completare il ciclo con 1 dose di esavalente; vaccinare per MPR
- Se il soggetto ha effettuato solo la vaccinazione contro il tetano:
 - **se è ≥7 anni:** in questo caso si ci deve attenere alla tabella precedente considerando il soggetto come se fosse completamente non vaccinato e somministrare i prodotti indicati in base all'età (poiché non sono disponibili prodotti monovalenti che contengano solo il vaccino antidifterite, sarà necessario rivaccinarlo anche contro il tetano). Si dovranno somministrare 2 dosi di dT, 2 dosi di Ipv e concludere con 1 dose di dTPa-Ipv. Vaccinare per Epatite B (3 dosi), MPR e Hib
 - **se >3 ma < 7 anni:** in questo caso si ci deve attenere alla tabella precedente considerando il soggetto come se fosse completamente non vaccinato e somministrare i prodotti indicati in base all'età (poiché non sono disponibili prodotti monovalenti che contengano solo

il vaccino antidifterite, sarà necessario rivaccinarlo anche contro il tetano). Si dovranno somministrare 2 dosi di DTPa-Ipv (per immunizzazione primaria) e concludere il ciclo con 1 dose di DTPa-Ipv (dose booster); Vaccinare per Epatite B (3 dosi), MPR e Hib.

- **se è <3 anni:** in questo caso si deve attenere alla tabella precedente considerando il soggetto come se fosse completamente non vaccinato e somministrare i prodotti indicati in base all'età (poiché non sono disponibili prodotti monovalenti che contengano solo il vaccino antidifterite, sarà necessario rivaccinarlo anche contro il tetano). Si dovranno somministrare 3 dosi di Esavalente; vaccinare per MPR.

NOTA BENE:

Vale la regola che si possono somministrare 6 dosi di vaccino anti-tetano in 6 anni

- Se il soggetto ha effettuato solo la vaccinazione contro il tetano e quella contro la polio:
 - **se è ≥7 anni:** in questo caso si deve attenere alla tabella precedente considerando il soggetto come se fosse completamente non vaccinato e somministrare i prodotti indicati in base all'età (poiché non sono disponibili prodotti monovalenti che contengano solo il vaccino antidifterite, sarà necessario rivaccinarlo anche contro il tetano). Si dovranno somministrare 2 dosi di dT e chiudere il ciclo con 1 dose di dTPa. Vaccinare per Epatite B (3 dosi), MPR e Hib.
 - **se è <7 anni:** in questo caso è possibile effettuare un ciclo di 3 dosi di DTPa pediatrico. Vaccinare per Epatite B (3 dosi), MPR e Hib.
- Se il soggetto ha effettuato le vaccinazioni contro difterite, tetano e pertosse:
 - **Indipendentemente dall'età:** vaccinare per polio (3 dosi di Ipv), per Epatite B (3 dosi), MPR e Hib.
- Se il soggetto ha effettuato le vaccinazioni contro difterite, tetano, polio e pertosse:
 - **Indipendentemente dall'età:** vaccinare per Epatite B (3 dosi), MPR e Hib.